635
Cat
Bre

Verzeichnifs
von
Hundert Arten Georginen,
welche zu bekommen sind
bey dem
Kunst- und Handelsgärtner C. A. Breiter
in Leipzig.

No.

1. *Georgina variabilis* aeruginosa.
2. — — alba.
3. — — — grandiflora.
4. — — albida.
5. — — — intus lactea.
6. — — atrococcinea.
7. — — atropurpurea.
8. — — — plena.
9. — — — laciniata.
10. — — atrorubens.
11. — — aurantiaca.
12. — — — striata.
13. — — — coccinea striata.
14. — — aurea.
15. — — badia.
16. — — cana.
17. — — caesia.
18. — — cardinalis.
19. — — carnea.
20. — — coccinea.
21. — — — grandiflora.
22. — — — laciniata.
23. — — — plena.
24. — — — semiplena.
25. — — — splendens.
26. — — — speciosa.
27. — — — spectabilis.
28. — — — radio luteo.
29. — — — — striato.
30. — — — minima.
31. — — — — intus lutea.
32. — — coerulea.
33. — — crocea.
34. — — cyanea.
35. — — flava.
36. — — — grandiflora.
37. — — — — striata.
38. — — — plena.
39. — — flavovirens.
40. — — fusca.
41. — — grisea.
42. — — — intus lutea.
43. — — — striata.
44. — — incarnata.
45. — — — grandiflora.
46. — — — laciniata.
47. — — lactea.
48. — — lateritia.
49. — — lilacina.
50. — — — alba striata.

No.

51. *Georgina variabilis* lilacina grandiflora.
52. — — — intus lutea.
53. — — — — purpurea.
54. — — livida.
55. — — lutea striata.
56. — — — — grandiflora.
57. — — — maculata.
58. — — miniata.
59. — — — grandiflora.
60. — — — splendens.
61. — — nigra.
62. — — ochracea.
63. — — pallida.
64. — — — grandiflora.
65. — — phönicea.
66. — — punicea.
67. — — — grandiflora.
68. — — — laciniata.
69. — — — semiplena.
70. — — purpurea.
71. — — — intus lutea.
72. — — — — nigra.
73. — — — laciniata.
74. — — — striata.
75. — — — plena.
76. — — — semiplena.
77. — — — grandiflora.
78. — — radio magno puniceo fulgido.
79. — — rosea.
80. — — — intus lutea.
81. — — — — purpurea.
82. — — — striata.
83. — — rubra.
84. — — — grandiflora.
85. — — — — laciniata.
86. — — — intus lutea.
87. — — — semiplena.
88. — — — striata.
89. — — sanguinea.
90. — — — grandiflora.
91. — — — splendens.
92. — — — spectabilis.
93. — — sulphurea.
94. — — violacea.
95. — — — intus lutea.
96. — — — grandiflora.
97. — — — pallida.
98. — — — laciniata.
99. — — vitellina.
100. — — — semiplena.

BIBLIOTHEQUE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
VILLE DE GENEVE

Dieses, jetzt so allgemein beliebte prächtigblühende perennirende Knollengewächs, habe in Ansehung des Verkaufs in 8 Abtheilungen gebracht, und erlasse den Knollen oder Exemplar gegen baare Zahlung und portofreye Briefe:

Von der 1sten	Abtheil.	der gewöhnlichern Sorten	zu 4	Groschen.
— — 2ten	—	besserer Sorten	– 8	—
— — 3ten	—	schöner blühenden Sorten	– 12	—
— — 4ten	—	noch schöner blühenden Sorten	– 16	—
— — 5ten	—	mit immer zunehmender Schönheit der Blumen .	– 20	—
— — 6ten	—	— — — — — — — — .	– 24	—
— — 7ten	—	— — — — — — — — .	– 32	—
— — 8ten	—	ganz neuen und seltenen Sorten	– 48	—

Auch den Saamen habe in 8 Abtheilungen gesammelt, und erlasse

Von der 1sten	Abtheil.	gewöhnlicher Sorten, die starke Prise . . .	zu 4	Groschen.
— — 2ten	—	besserer Sorten — — —	– 6	—
— — 3ten	—	und so in aufsteigender Schönheit der Sorte . .	– 8	—
— — 4ten	—	. . . .	– 10	—
— — 5ten	—	. . . .	– 12	—
— — 6ten	—	. . . .	– 14	—
— — 7ten	—	. . . .	– 16	—
— — 8ten	—	. . . .	– 18	—

Oder das ganze Sortiment von Saamen der 8 Abtheilungen für . 3 Rthlr. 12 Gr.

Den Saamen von jeder einzelnen Sorte zu sammeln, wäre, wenn auch die Zeit daran gewendet würde, um deswillen nicht nöthig, da man aus einer Farbe immer andere Varietäten erhält.

Diese prachtvolle Zierpflanze, welche vom Monat Juny bis zum ersten starken einfallenden Froste im Herbst mit mehr denn hundertfältigen herrlich glänzenden Blumen durch alle Farbenmischungen pranget, wird auf folgende, gar nicht kostspielige Art ausgewintert: Die Knollen kann man so lange in der Erde lassen, als der Frost nicht eindringt, dann werden sie heraus genommen, und in trockner Erde, Sand, Häckerling, oder Sägespäne, in einem Kasten oder ähnlichem Gefäſs, mehrere Lagen übereinander eingeschlagen, und an einem frostfreyen Orte, ohne das Gefäſs zuzudecken, aufbewahrt, und den Winter über trocken gehalten. Sobald im Frühjahr die Fröste nachgelassen, werden sie in die Erde gepflanzt und in Ermangelung des Regens angegossen. Wer Gelegenheit hat, die Knollen im Frühjahr recht zeitig vorhero in Töpfe zu pflanzen, und auf ein mäſsigwarmes Mistbeet, oder auch, wenn keins vorhanden, ins Zimmer zum Antreiben zu stellen, kann solche mehrere Wochen früher blühend haben, wo sie alsdann bey dem Nachlassen der Nachtfröste ins Land gepflanzt werden, und ohne Unterlaſs fortblühen, übrigens kommen sie in jeder, selbst in der schlechtesten Erdart fort, in trocknem Boden pflegt man sie anfänglich, um des bessern Wachsthums willen, öfters anzugieſsen.

Von den vorzüglichsten Blumen sind Abbildungen bey mir einzusehen, und können auf Bestellung Copien an resp. Liebhaber abgelassen werden.

Leipzig im Monat November 1815.

Breiter.

BOTA 38240

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer